

Contenu du CR type de coloscopie requis pour validation par le réseau HerMION			
Chapitre	Alinea	Contenu	Commentaire
Indication	-	Syndrome et gène muté le cas échéant (avec statut allélique pour MUTYH) Type de cancer et chirurgie réalisée le cas échéant	-
Technique d'examen	Type	Coloscopie, rectoscopie... Préciser le matériel utilisé (coloscope haute définition recommandé) et la technique de coloration (chromoendoscopie à l'indigo carmin recommandée)	
	Qualité	Pour la coloscopie, score de Boston par segment (côlon droit, côlon transverse y compris les angles, côlon gauche)	Si score de Boston total < 7 ou score ≤ 1 sur ≥ 1 segment, examen à refaire dans les 3 mois
	Progression	Pour la coloscopie, caecum ou iléon terminal	Autre si obstacle
	Durée	Pour la coloscopie, temps de retrait en minutes	Suffisant si 6-10 min
Résultats	Côlon	Description par segment. Si polype(s), nombre, taille, aspect et localisation suivant la classification de Paris	Si polype plan de type ulcéré ou déprimé (type III et IIC de la classification de Paris), contre-indication à la résection endoscopique
	Rectum	Description. Si polype(s), nombre, taille, aspect et localisation (distance par rapport à la marge anale) suivant la classification de Paris	
	Si polype(s)	Technique(s) de résection et nombre de fragments adressés en anatomo-pathologie le cas échéant	
Conclusion	-	En cas d'examen normal, indication du délai pour l'examen suivant	-